

# TERAPIA SOTTOCUTANEA SCIT IMMUNOTERAPIA SPECIFICA SOTTOCUTANEA ACQUOSA PER VELENO DI IMENOTTERI

La terapia acquosa sottocutanea per veleno di imenotteri è costituita da un flacone di estratto acquoso di veleno purificato di imenotteri da 100mcg/ml, 5,5 ml per flacone e da tre flaconi di soluzione fisiologica preservata da 4,5 ml per flacone.


La somministrazione del prodotto avviene per via sottocutanea nella parte superiore del braccio. La terapia deve essere effettuata esclusivamente sotto diretto controllo medico. Il paziente deve rimanere in osservazione medica per almeno 30 minuti dalla somministrazione del vaccino.



Il prodotto non contiene Albumina umana



## SCHEMA TERAPEUTICO INIZIALE



- N.1 flacone etichetta rossa da 100 mcg/ml di veleno di imenotteri di 5,5 ml.
- N.3 flaconi etichetta bianca di soluzione fisiologica preservata da 4,5 ml.

Le iniezioni che vengono effettuate nell'arco della stessa giornata devono essere intervallate ogni 30 minuti.

## TERAPIA DI MANTENIMENTO

Una volta raggiunta la dose di mantenimento l'intervallo tra le iniezioni aumenta in modo graduale fino a raggiungere le 4 settimane.

I flaconi sono confezionati in un contenitore di protezione in plastica rigida.