

TERAPIA SOTTOCUTANEA SCIT IMMUNOTERAPIA SPECIFICA SOTTOCUTANEA ADSORBITA SU L-TIROSINA


PER VELENO DI IMENOTTERI

La terapia sottocutanea ritardo L-Tirosina per veleno di imenotteri è costituita da due flaconi induttivi di estratto ritardo L-Tirosina di veleno purificato rispettivamente 1 mcg/ml e 10 mcg/ml in flaconi da 5 ml e da un flacone di mantenimento di estratto ritardo L-Tirosina di veleno purificato di imenotteri, 100mcg/ml, in flacone da 5 ml.

La somministrazione del prodotto avviene per via sottocutanea nella parte superiore del braccio. La terapia deve essere effettuata esclusivamente sotto diretto controllo medico. Il paziente deve rimanere in osservazione medica per almeno 30 minuti dalla somministrazione del vaccino.



SCHEMA TERAPEUTICO INIZIALE



- N.1 flacone etichetta verde da 1 mcg/ml di veleno di imenotteri di 5,0 ml.
- N.1 flacone etichetta gialla da 10 mcg/ml di veleno di imenotteri di 5,0 ml.
- N.1 flacone etichetta rossa da 100 mcg/ml di veleno di imenotteri di 5,0 ml.

TERAPIA DI MANTENIMENTO

- N.1 flacone etichetta rossa da 100 mcg/ml di veleno di imenotteri di 5,0 ml.

I flaconi sono confezionati in un contenitore di protezione in plastica rigida.